

# QURA MUK

## N-ACETILCISTEÍNA

POLVO PARA PREPARAR JARABE

### INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dársele a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### - Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es **QURA MUK** y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **QURA MUK**?
3. ¿Cómo tomar **QURA MUK**?
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **QURA MUK**
6. Contenido del envase e información adicional.

#### 1. ¿Qué es **QURA MUK** y para qué se utiliza?

**QURA MUK** contiene el principio activo N-Acetilcisteína que pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos y se utiliza para fluidificar las secreciones bronquiales excesivas y/o espesas.

#### 2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **QURA MUK**?

-No tome **QURA MUK**:

- Si es alérgico a la N-acetilcisteína, a otros mucolíticos, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece úlcera gastroduodenal.
- Si es asmático o presenta insuficiencia respiratoria grave.

- **Advertencias y precauciones:**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **QURA MUK** si padece asma u otros problemas respiratorios.

- **Toma de **QURA MUK** con otros medicamentos**

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Si está tomando medicamentos contra la tos o que reducen las secreciones bronquiales, consulte a su médico antes de tomar **QURA MUK** conjuntamente con éstos.

- **Toma de **QURA MUK** con alimentos y bebidas**

No se han descrito interferencias si se toma **QURA MUK** con alimentos y bebidas.

- **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

- **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito interferencias si se está tomando **QURA MUK** sobre la conducción y/o el uso de máquinas.

#### 3. ¿Cómo tomar **QURA MUK**?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico. El polvo debe reconstituirse previamente y administrarse luego de la ingesta de alimentos.

Las dosis generalmente recomendadas son:

**Adultos y niños mayores de 14 años:** 10 ml (200 mg de N-acetilcisteína) 3 veces por día, equivalente a 600 mg de N-acetilcisteína / día.

**Niños entre 6 y 14 años:** 5 ml (100 mg de N-acetilcisteína) 4 veces por día, equivalente a 400 mg de N-acetilcisteína / día o 10 ml (200 mg de N-acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 400 mg de N-acetilcisteína / día.

**Niños entre 2 y 5 años:** 5 ml (100 mg de N-acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 200 mg de N-acetilcisteína / día.

**Niños entre 1 y 2 años:** 2.5 ml (50 mg de N-acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 100 mg de N-acetilcisteína / día.

**Tratamiento de la Mucoviscidosis:**

**Niños mayores de 6 años:** 10 ml (200 mg de N-acetilcisteína) 3 veces por día, equivalente a 600 mg de N-acetilcisteína / día.



**Niños entre 2 y 6 años:** 5 ml (100 mg de N-acetilcisteína) 4 veces por día, equivalente a 400 mg de N-acetilcisteína / día.  
**Niños entre 1 y 2 años:** 2,5 ml (50 mg de N-acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 100 mg de N-acetilcisteína / día.

Prepare el jarabe como se detalla a continuación:

Agregar agua de la canilla (no usar agua mineral) hasta la marca de la etiqueta. Cerrar el frasco y agitar intensamente. Una vez que haya desaparecido la espuma agregar nuevamente agua de la canilla hasta la marca de la etiqueta y agitar el frasco. Este proceso debe repetirse hasta que la solución haya alcanzado el nivel de la marca.

**Una vez reconstituido el jarabe debe conservarse en heladera durante un máximo de 12 días.**

**- Si toma más QURA MUK del que debe:**

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico, concorra al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247 / 6666.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777"

**- Si olvidó tomar QURA MUK:**

• No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

• Es preferible que consulte a su médico.

• Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico.

**- Si interrumpe el tratamiento con QURA MUK**

Su médico le indicará la duración del tratamiento con **QURA MUK**.

No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se logrará el efecto previsto.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, **QURA MUK** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo los más frecuentes gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas), así como urticaria, cefaleas y fiebre. Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad, en piel y aparato respiratorio caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico. Todas las preparaciones conteniendo N-acetilcisteína pueden provocar en el aire expirado en forma pasajera olor desagradable, probablemente debido a la liberación de hidrogeno sulfurado. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **5. Conservación de QURA MUK**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice **QURA MUK** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. **Una vez preparado el jarabe conservar el mismo hasta 12 días en heladera.**

**Pasada dicha fecha descartar el contenido.**

#### **6. Contenido del envase e información adicional de QURA MUK**

El principio activo de **QURA MUK** es N-acetilcisteína.

Los demás componentes son:

Sacarosa, Esencia de frutilla en polvo, Ácido ascórbico, Esencia de banana en polvo, Sucralosa, Metilparabeno, Propilparabeno y Sorbitol.

**- Aspecto del producto y contenido del envase**

**QURA MUK** es un polvo para preparar jarabe.

Cada envase contiene un frasco con polvo para preparar 100 ml de jarabe.

**MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT:**

**<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54.395.

Dirección Técnica: Vicente López González, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 29/11/18



LABORATORIOS BERNABÓ S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Tel.: 4501-3278/79, www.laboratoriosbernabo.com

Elaboración: Terrada 2346, CABA y/o Colectora Ruta Panamericana Ramal Pilar Km. 36 N° 3863, Tortuguitas,

Partido de Malvinas Argentinas, Prov. de Buenos Aires y/o Fray Cayetano Rodríguez 3520, B1702BSN, Ciudadela,

Partido de Tres de Febrero, Prov. de Bs. As.

