

QURA MUK

N-ACETILCISTEÍNA

POLVO PARA PREPARAR JARABE

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

- Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es **QURA MUK** y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **QURA MUK**?
3. ¿Cómo tomar **QURA MUK**?
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **QURA MUK**
6. Contenido del envase e información adicional.

1. ¿Qué es **QURA MUK** y para qué se utiliza?

QURA MUK contiene el principio activo N-Acetilcisteína que pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos y se utiliza para fluidificar las secreciones bronquiales excesivas y/o espesas.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar **QURA MUK**?

-No tome **QURA MUK**:

- Si es alérgico a la N-Acetilcisteína, a otros mucolíticos, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece úlcera gastroduodenal.
- Si es asmático o presenta insuficiencia respiratoria grave.

- **Advertencias y precauciones:**

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **QURA MUK** si padece asma u otros problemas respiratorios.

- **Toma de **QURA MUK** con otros medicamentos**

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Si está tomando medicamentos contra la tos o que reducen las secreciones bronquiales, consulte a su médico antes de tomar **QURA MUK** conjuntamente con éstos.

- **Toma de **QURA MUK** con alimentos y bebidas**

No se han descrito interferencias si se toma **QURA MUK** con alimentos y bebidas.

- **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

- **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito interferencias si se está tomando **QURA MUK** sobre la conducción y/o el uso de máquinas.

3. ¿Cómo tomar **QURA MUK**?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico. El polvo debe reconstituirse previamente y administrarse luego de la ingesta de alimentos.

Las dosis generalmente recomendadas son:

Adultos y niños mayores de 14 años: 10 ml (200 mg de N-acetilcisteína) 3 veces por día, equivalente a 600 mg de N-acetilcisteína / día.

Niños entre 6 y 14 años: 5 ml (100 mg de N-Acetilcisteína) 4 veces por día, equivalente a 400 mg de N-Acetilcisteína / día o 10 ml (200 mg de N-Acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 400 mg de N-acetilcisteína / día.

Niños entre 2 y 5 años: 5 ml (100 mg de N-Acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 200 mg de N-Acetilcisteína / día.

Niños entre 1 y 2 años: 2,5 ml (50 mg de N-Acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 100 mg de N-Acetilcisteína / día.

Tratamiento de la Mucoviscidosis





Niños mayores de 6 años: 10 ml (200 mg de N-Acetilcisteína) 3 veces por día, equivalente a 600 mg de N-Acetilcisteína / día.

Niños entre 2 y 6 años: 5 ml (100 mg de N-Acetilcisteína) 4 veces por día, equivalente a 400 mg de N-Acetilcisteína / día.

Niños entre 1 y 2 años: 2,5 ml (50 mg de N-Acetilcisteína) 2 veces por día, equivalente a 100 mg de N-Acetilcisteína / día.

Prepare el jarabe como se detalla a continuación:

Agregar agua de la canilla (no usar agua mineral) hasta la marca de la etiqueta. Cerrar el frasco y agitar intensamente. Una vez que haya desaparecido la espuma agregar nuevamente agua de la canilla hasta la marca de la etiqueta y agitar el frasco. Este proceso debe repetirse hasta que la solución haya alcanzado el nivel de la marca.

Una vez reconstituido el jarabe debe conservarse en heladera durante un máximo de 12 días.

- Si toma más QURA MUK del que debe:

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico, concorra al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247 / 6666.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777*

- Si olvidó tomar QURA MUK:

• No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

• Es preferible que consulte a su médico.

• Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento pregunte a su médico.

- Si interrumpe el tratamiento con QURA MUK

Su médico le indicará la duración del tratamiento con **QURA MUK**.

No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se logrará el efecto previsto.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, **QURA MUK** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo los más frecuentes gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas), así como urticaria, cefaleas y fiebre. Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad, en piel y aparato respiratorio caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico. Todas las preparaciones conteniendo N-Acetilcisteína pueden provocar en el aire expirado en forma pasajera olor desagradable, probablemente debido a la liberación de hidrógeno sulfurado. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de QURA MUK

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice **QURA MUK** después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. **Una vez preparado el jarabe conservar el mismo hasta 12 días en heladera. Pasada dicha fecha descartar el contenido.**

6. Contenido del envase e información adicional de QURA MUK

El principio activo de **QURA MUK** es N-Acetilcisteína.

Los demás componentes son:

Sacarosa, Esencia de frutilla en polvo, Ácido ascórbico, Esencia de banana en polvo, Sucralosa, Metilparabeno, Propilparabeno y Sorbitol.

- Aspecto del producto y contenido del envase

QURA MUK es un polvo para preparar jarabe.

Cada envase contiene un frasco con polvo para preparar 100 ml de jarabe.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ante cualquier inconveniente con el producto o el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: 0800-333-1234.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54.395.

Dirección Técnica: Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 29/11/18



Laboratorios Bernabó

LABORATORIOS BERNABÓ S.A.

Terrada 2346, C1416ARZ, CABA, Tel.: (011) 4501-3278/79, www.laboratoriosbernabo.com

Elaboración: Terrada 2346, CABA y/o Colectora Ruta Panamericana Ramal Pilar Km. 36 N° 3863, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Prov. de Buenos Aires y/o Fray Cayetano Rodríguez 3520, B1702BSN, Ciudadela, Partido de Tres de Febrero, Prov. de Bs. As.

